

## KULLANMA TALİMATI

### ACUITEL® 5 mg bölünebilir film kaplı tablet Ağızdan alınır.

- **Etkin madde:** 5 mg kinaprile eşdeğer 5.416 mg kinapril hidroklorür
- **Yardımcı maddeler:** Magnezyum karbonat (E504i), magnezyum stearat (E572), laktoz, jelatin, krospovidon, opadry yellow Y-5-6330G (hidroksipropil metil selüloz, hidroksipropil selüloz, titanyum dioksit (E171), polietilen glikol, sarı demir oksit (E172iii), kırmızı demir oksit (E172ii), kandelila mumu. Ürün, sığır kaynaklı laktoz ve jelatin hamaddeleri içermektedir.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **ACUITEL nedir ve ne için kullanılır?**
2. **ACUITEL'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **ACUITEL nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **ACUITEL'in saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

### **1. ACUITEL nedir ve ne için kullanılır?**

- Her bir bölünebilir film kaplı tablet, 5 mg kinaprile eşdeğer kinapril hidroklorür içeren 20 tabletlik blister ambalajda kullanıma sunulmuştur.
- ACUITEL sarı, oval, bir tarafı çentikli, diğer tarafında "5" baskısı bulunan bölünebilir film kaplı tablettir.
- ACUITEL anjiyotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleri olarak adlandırılan bir ilaç grubuna aittir. Bu tür ilaçlar kan damarlarını genişletir ve bu da damarlardaki basıncı azaltabilir.
- ACUITEL, yüksek tansiyon ve kalp yetersizliği tedavisinde kullanılır.

### **2. ACUITEL'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

**ACUITEL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eğer;

- Kinapril veya ACUITEL'in bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa (deride kaşıntı, döküntü, kızarıklık veya nefes almada zorluk oluşabilir),
- Hamileyseniz, hamile kalmaya çalışıyorsanız ya da emziriyorsanız,
- Alerji sonucu yüz, dil ve boğazda şişme durumunuz varsa (anjioödem),
- Ana atardamarınızda (aort) daralma varsa,
- Böbrek hastalığınız varsa,
- Şeker hastalığı veya böbrek fonksiyonu bozukluğu olanlarda kan basıncını düşürmek için aliskiren içeren bir ilaç kullanıyorsanız.

### **ACUITEL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

Eğer;

- Böbrek yetmezliğiniz varsa ya da kan diyaliz makinesi (yapay böbrek) kullanıyorsanız,
- Sarılık ya da herhangi bir karaciğer hastalığı belirtisi yaşarsanız derhal doktorunuzla iletişime geçiniz, ,
- Kalp hastalığı ya da kalp yetersizliğiniz varsa,
- Önceden yüksek kan basıncı tedavisi için ilaç kullanımı sonucu kan basıncında ani düşüş yaşadığınız,
- Damar hastalığınız varsa,
- Kanınızın bir makine yardımı ile kolesterolden arındırılması işlemi görüyorsanız ya da görecekseniz (LDL aferezi),
- Alerji ya da astımınız varsa,
- Alerjiye karşı duyarsızlaştırma tedavisi görüyorsanız ya da görecekseniz (örn. arı sokması alerjisinin etkilerinin azaltılması)
- Şeker hastalığınız varsa,
- Başka ilaçlar kullanıyorsanız, potasyum katkıları veya potasyum içeren tuz yerine geçen maddeler kullanıyorsanız,
- Kan basıncı ve sıvı dengesini düzenleyen bir sistem olan renin anjiyotensin sistemini etkileyen aşağıdaki ilaçlardan birini kullanıyorsanız:
  - Anjiyotensin II reseptör blokörleri (sartanlar olarak da bilinir – örn. Valsartan, telmisartan, irbesartan), özellikle böbrek problemi kaynaklı diyabet hastalığınız varsa
  - Aliskiren gibi direkt renin inhibitörleri
- ACUITEL ile birlikte tümör hücrelerinin büyüme ve bölünmesini önleyen; mTOR inhibitörü olarak bilinen ilaçlar (örn. temsirolimus) veya şeker hastalığı tedavisinde kullanılan, DPP-IV inhibitörü olarak bilinen ilaçlar (örn. vildagliptin) kullanıyorsanız,
- Hamileyseniz ya da hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız (Zarar verebileceğinden dolayı kesinlikle kullanmayınız.),
- Düşük tansiyonunuz varsa,
- Nötropeni işareti olan herhangi bir enfeksiyon belirtisi (örn. boğaz ağrısı, ateş) varsa,
- Öksürüğünüz varsa,
- Eğer size cerrahi ve/veya anestezi uygulaması yapılması planlanıyorsa,
- Laktoz, galaktoz gibi şekerlere karşı tahammülsüzlük varsa

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Doktorunuz düzenli olarak böbrek fonksiyonlarınızı, kan basıncınızı ve kanınızdaki elektrolit (örn. Potasyum) miktarlarını kontrol edebilir.

## **ACUITEL'in yiyecek ve iecek ile kullanılması**

ACUITEL a ya da tok alınabilir.

## **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

ACUITEL hamilelerde kullanılmaz.

Hamileyseniz ya da hamile kalmaya alıřıyorsanız ACUITEL'i kesinlikle kullanmayınız.

*Tedaviniz sırasında hamile olduėunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

## **Emzirme**

*İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

Emziriyorsanız ACUITEL kullanmayınız.

## **Ara ve makine kullanımı**

ACUITEL, zellikle tedavinizin bařlangıcında ara ve makine kullanma yeteneėinizi olumsuz etkileyebilir. Sersemlik veya yorgunluk hissediyorsanız ara ve makine kullanmayınız, derhal doktorunuza danıřınız.

## **ACUITEL'in ieriėinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında nemli bilgiler**

ACUITEL laktoz ierir. Eėer daha nceden doktorunuz tarafından bazı řekerlere karřı dayanıksızlıėınız olduėu sylenmiřse bu tıbbi rn almadan nce doktorunuzla temasa geiniz.

## **Diėer ilalar ile birlikte kullanımı**

ACUITEL ile etkileřimi olabilecek bazı ilalar:

- Anjiyotensin II reseptr blokrleri veya aliskiren,
- Kan basıncını dřren bařka ilalar ve idrar sktrc (diretik) ilalar,
- Tetrasiklin olarak adlandırılan enfeksiyon tedavisinde kullanılan ilalar,
- Sulfametoksazol ve trimetoprim gibi antibiyotikler,
- Potasyum destek tedavisi (potasyum ieren tuz bileřenleri dahil),
- Lityum (depresyon, bipolar bozukluk tedavisi iin bir ila),
- Aėrı, ateř ve iltihaba etkili ilalar (non steroid antiinflatuvar ilalar; aspirin, ibuprofen dahil),
- Kortizon ieren ilalar (hidrokortizon, deksametazon ya da prednizolon),
- Dzensiz kalp atıřlarını dzenlemek iin kullanılan ila (prokainamid), kanser tedavisinde kullanılan ilalar (sitostatik ilalar), baėıřıklık sistemini baskılayan ilalar (Crohn hastalıėı, romatoid artrit gibi baėıřıklık sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilalar), sregelen gut tedavisinde kullanılan ila (allopurinol),
- Sindirim glė ve yemek borusunda yanma hissine karřı kullanılan ilalar (antiasitler),
- Sakinleřtirici etkisi olan madde ve ilalar (alkoll iecekler ve uyku hapları dahil),
- řeker hastalıėı tedavisinde kullanılan ilalar (vildagliptin dahil),

- Böbreküstü bozukluklarında kullanılan ilaçlar (tetrakosaktrin),
- Kalp yetersizliği ve şok tedavisinde kullanılan ilaçlar (sempatomimetikler),
- Tümör hücrelerinin büyüme ve bölünmesini önleyen; mTOR inhibitörü olarak bilinen ilaçlar (örn. temsirolimus) veya şeker hastalığı tedavisinde kullanılan, DPP-IV inhibitörü olarak bilinen ilaçlar (örn. vildagliptin),
- Enjeksiyon yoluyla kullanılan altın içeren ilaçlar (örn. sodyum orotiyomalat),
- Kan basıncını düşürmek için kullanılan bir ilaç olan aliskiren şeker hastalığı veya böbrek fonksiyonu bozukluğu olanlarda ACUITEL ile birlikte kullanılmamalıdır.
- Anestezikler.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. ACUITEL nasıl kullanılır?**

- **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

Yüksek tansiyon tedavisinde genel başlangıç dozu günde 10 mg'dır. Eğer bu dozlarla kan basıncınız kontrol altına alınmazsa, doktorunuz günlük dozu kademeli olarak 80 mg'a kadar yükseltebilir.

Konjestif kalp yetersizliğinde, beraberinde bir de idrar söktürücü (diüretik) ilaç kullanıyorsanız, ya da böbrek yetmezliğiniz varsa genel başlangıç dozu günde 2.5 mg'dır. Doktorunuz konjestif kalp yetersizliğinde günlük dozu maksimum 40 mg'a kadar yükseltebilir.

- **Uygulama yolu ve metodu:**

ACUITEL'i günde bir ya da iki kez alınız.

ACUITEL'i sabah veya akşam aç veya tok karnına alabilirsiniz.

Tabletlerinizi her gün aynı saatte almaya çalışınız.

ACUITEL'i bütün olarak, yeterli miktarda su ile yutunuz. Tabletleri çiğnemeyiniz veya ezmeyiniz.

- **Değişik yaş grupları:**

#### **Çocuklarda kullanımı:**

Çocukların ve 18 yaşın altındaki ergenlerin ACUITEL kullanması tavsiye edilmez.

#### **Yaşlılarda kullanımı:**

ACUITEL'in yaşlılarda önerilen başlangıç dozu günde 2.5 mg'dır.

- **Özel kullanım durumları:**

#### **Böbrek yetmezliği:**

Böbrek yetmezliğiniz varsa başlangıç dozu 2.5 mg'dır. Devam dozunuza doktorunuz karar vermelidir.

Eğer ACUITEL'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

#### **Kullanmanız gerekenden daha fazla ACUITEL kullandıysanız:**

ACUITEL'den fazla kullanmak kendinizi kötü hissettirebilir. ACUITEL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

#### **ACUITEL'i kullanmayı unutursanız:**

İlacınızı almayı unutursanız, unuttuğunuz dozu atlayarak bir sonraki dozunuzu her zamanki saatinde alınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

#### **ACUITEL ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:**

Doktorunuz tedaviyi kesmenizi söylemedikçe ACUITEL'i almayı bırakmayınız. Tedavi sonlandırıldığında herhangi bir etkinin oluştuğuna dair bilgi mevcut değildir, ancak doktorunuzun bilgisi dışında tedaviyi kesmeniz durumunda yüksek tansiyon nedeniyle zarar görebilirsiniz.

#### **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi ACUITEL'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

#### **Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz.**

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde tanımlanmıştır:

Çok yaygın	:10 hastanın en az birinde görülebilir .
Yaygın	:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan	:100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek	:1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek	:10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor	:Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

#### **Aşağıdakilerden biri olursa ACUITEL'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Nefes alma güçlüğüne sebep olan yüz, dil ve boğazda şişme (anjiyoödem),
- Kusmaya sebep olan aşırı karın ağrısı (barsaklarda anjiyoödem),
- Hastalık hissi ile gelen ve sırta yayılabilen şiddetli karın ağrısı (pankreas iltihabı),
- Anjina ya da kalp krizi belirtisi olabilecek göğüs ağrısı, göğüste sıkışma, nefes darlığı, hırıltılı nefes alma ya da nefes almada zorluk ve düzensiz veya hızlı kalp atışı.
- Olası bir felcin belirtisi olabilecek kollarda, bacaklarda, yüzde güçsüzleşme, konuşma güçlüğü ya da görmede bozukluk,
- Ani şiddetli baş ağrısı, nöbet, koordinasyon ve denge kaybı (serebrovasküler olay)
- Deri döküntüsü, sıyrıklar, tahriş, kaşıntı, ürtiker, kabarıklık, soyulma,

- KIRMIZI veya mor deri döküntüsü, deride ağrı, tahriş, deri ve ağızda kabarıklık, ateş ve grip benzeri belirtiler sonrası burun, gözler, üreme organları, yüz ve dilde şişme (Stevens-Johnson Sendromu),
- Birden ayağa kalkınca bayılma hissi. Bu tansiyonunuzun çok düştüğü anlamına gelebilir. ACUITEL ile birlikte başka tansiyon ilacı alıyorsanız, alkol kullandıysanız ya da susuz kaldıysanız veya diyalizdeyseniz bunun olma olasılığı artar. Bayılacak gibi hissettiğinizde, bu duygu geçene kadar uzanınız.
- Özellikle böbrek yetmezliğiniz veya damar hastalığınız varsa, şiddetli boğaz ağrısı ya da ciddi ağız yaraları oluyorsa bu kanınızda yetersiz beyaz kan hücreniz olduğu anlamına gelebilir ve enfeksiyon ya da ateş riskini arttırabilir.
- Göğüs ağrısı, göğüs sıkışması, nefes darlığı, nefes alıp verirken ısıklık çalar gibi ses çıkması, nefes alma güçlüğü,
- Ciltte ve göz aklarında sararma (sarılık).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ACUITEL'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

**Asağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:**

Yaygın:

- Kendini hastaymış gibi hissetmek veya hasta olmak
- Baş ağrısı
- Sersemlik
- Yorgunluk, güçsüzlük, enerji düşüklüğü
- Öksürük, boğaz iltihabı
- Burun tıkanması ve/veya akıntısı (rinit)
- Kan potasyum seviyesinde artış
- Sindirim güçlüğü
- Uykusuzluk
- Deride gıdıklanma, iğnelenme ya da yanma hissi
- Sırt ağrısı
- Düşük kan basıncı
- İshal
- Göğüs ağrısı
- Kaslarda ağrı
- Kanda kreatinin ve kan üre artışı

Yaygın olmayan:

- Depresyon, sinirlilik, kafa karışıklığı
- Vücutta su tutulması
- Sinüslerde iltihap (sinüzit), bronşit, üst solunum yolu enfeksiyonu
- Erkek cinsel organında sertleşmenin sağlanamaması
- Uyuşukluk
- Kulakta çınlama veya ses
- Kan damarlarının genişlemesi

- Ağızda veya boğazda kuruluk
- Döküntü, deride kaşıntı
- Aşırı terleme
- İdrarda protein, idrar yolu enfeksiyonu, böbrek fonksiyonlarında azalma
- Hızlı kalp atışı (taşikardi)
- Ateş
- Görme bozukluğu ( gözlük ya da kontak lens kullanımıyla düzelmeyen)
- İç kulak problemi kaynaklı baş dönmesi ve sersemlik
- Gaz çıkarmak

Seyrek:

- Denge problemleri
- Kabızlık
- Tat alma duyusunda bozukluk
- Dilde ağrı
- Bir çeşit kan hücresi olan eozinofillerde artıştan kaynaklanan akciğerlerde şişme (eozinofilik pnömoni)

Çok seyrek:

- Bulanık görme
- Belirtileri mide ağrısı, bulantı, kusma ve barsak krampları olan barsak duvarlarının şişmesi (intestinal anjiyoödem)

Bilinmiyor:

- Kırmızı kan hücrelerinde anormal düşüş
- Morarma veya mor ya da kırmızı renkli döküntü
- Safra kanalında tıkanlık ya da karaciğerin iltihaplanması nedeniyle karın ağrısı
- Saç dökülmesi
- Yaralanma veya kolay kanama ile sonuçlanabilen beyaz kan hücrelerinde azalma ya da kan plateletlerinde azalma (trombositopeni), kırmızı kan hücrelerinde düşüklük (kansızlık)
- Deride ışığa karşı duyarlılık

ACUITEL, kanınızda belli değişikliklere neden olabilir. Eğer morarma, çok yorgun hissetme fark ederseniz veya şeker hastası iseniz ve şeker seviyelerinizin arttığını fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz. Bu durumda doktorunuz gerekirse kan testleri yaptırmanızı isteyebilir.

Bunlar ACUITEL'in hafif yan etkileridir.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza bilgilendiriniz.*

#### Yan etkilerin raporlanması

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi'ne (TÜFAM) bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

## **5. ACUITEL'in saklanması**

*ACUITEL'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C'nin altında oda sıcaklığında saklayınız.*

### **Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ACUITEL'i kullanmayınız.*

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ACUITEL'i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

***Ruhsat Sahibi:*** Pfizer PFE İlaçları A.Ş. Muallim Naci Cad. No:55 34347 Ortaköy-İSTANBUL

***Üretim yeri:*** Pfizer İlaçları Ltd. Şti. Muallim Naci Cad. No:55 34347 Ortaköy-İSTANBUL

Bu kullanma talimatı 10.05.2017 tarihinde onaylanmıştır.