

## KULLANMA TALİMATI

### ACYL® %5 krem Haricen kullanılır.

- **Etkin madde:** Her 1 g krem %5 a/a 50 mg asiklovir içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Tween 60, setostearil alkol, sodyum lauril sülfat, vazelin flant, vazelin likid, propilen glikol, deiyonize su

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak size için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **ACYL nedir ve ne için kullanılır?**
  2. **ACYL'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
  3. **ACYL nasıl kullanılır?**
  4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
  5. **ACYL'in saklanması**
- Başlıkları yer almaktadır.**

#### **1. ACYL nedir ve ne için kullanılır?**

ACYL, *Herpes simplex* (HSV) tip I ve II ile *Varicella zoster adlı* virüslere karşı etkili antiviral bir ilaçtır.

ACYL etken madde olarak asiklovir içerir ve 10 g'lık tüp ambalajlar halindedir.

ACYL, ilk ve tekrarlayan genital Herpes ve Herpes labialis de dahil olmak üzere Herpes simplex deri enfeksiyonlarının (uçuk) tedavisinde kullanılır.

#### **2. ACYL'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

##### **ACYL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eğer;

- ACYL'i kullanırken bir alerjik reaksiyon gelişirse (döküntü, bölgesel ağrı veya şişme) ilacı kullanmayı kesin ve doktorunuza söyleyin.
- Eğer asiklovir, valasiklovir (bir çeşit antiviral ilaç), propilen glikol veya ilacın içeriğindeki diğer maddelere alerjik iseniz bu ilacı kullanmayın.

##### **ACYL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

- ACYL'i, ağız, göz veya vajina gibi alanlara uygulanmanız tahriş edici olabileceğinden tavsiye edilmez. Kazara gözün içine girmemesine özellikle dikkat edin.
- Şiddetli bağışıklık yetmezliğiniz (örneğin; AIDS hastalığı veya kemik iliği nakli) varsa ACYL'in ağızdan alınan formları düşünülmelidir.

- Eđer bu tip bir hastalıđınız varsa herhangi bir enfeksiyon tedavisi iin mutlaka doktorunuza danıřınız.
- ACYL ierisinde bulunan setostearil alkol lokal deri reaksiyonlarına (örn. kontakt dermatite) sebep olabilir.
- ACYL özel bazı nedeniyle sulandırılmamalı veya diđer ilaların sulandırmak iin kullanılmamalıdır.

Bu uyarılar, gemiřteki herhangi bir dnemde dahi olsa sizin iin geerliyse ltfen doktorunuza danıřın.

### **ACYL'in yiyecek ve iecek ile birlikte kullanılması**

Geerli deđildir.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

Eđer hamileyseniz veya hamile olabileceđinizi dřunyorsanız doktorunuza syleyin. ACYL hamilelikte sadece size sađlayacađı yarar oluřturabileceđi risklerden fazla ise kullanılmalıdır.

*Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

Emzirme dneminde ACYL'in krem formu kullanıldıđında, stten bebeđe geecek miktarı nemsenmeyecek orandadır.

### **Ara ve makine kullanımı**

Ara ve makine kullanımı zerine veri yoktur.

### **ACYL'in ieriđinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında nemli bilgiler**

İeriđindeki propilen glikol nedeniyle ciltte iritasyona neden olabilir.

ACYL ieriđinde yer alan setostearil alkol lokal deri reaksiyonlarına (rn. kontakt dermatit) sebep olabilir.

Kremi kullanmadan nce ve sonra daima ellerinizi yıkayınız.

### **Diđer ilalar ile birlikte kullanımı**

ACYL diđer krem veya merhemlerle karıřtırılmamalıdır.

*Eđer reeteli ya da reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise ltfen doktorunuza veya eczacınızı bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. ACYL nasıl kullanılır?**

#### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklıđı iin talimatlar:**

ACYL'in nasıl kullanılacađı hakkında doktorunuzun talimatlarını talip edin.

ACYL'i, gnde 5 kez, gece dozu atlanmak suretiyle yaklařık 4 saatlik aralıklarla uygulayın

ACYL'i belirtilerin veya enfeksiyonun bařlamasından sonra mmkn olduđu kadar erken hasarlı blgeye uygulayın (kızarıklık veya hastalıđın bařlayacađına dair sezgi). Tedaviye sonraki belirtilerde de (kabarıklık veya sıvı dolu kabarcık) bařlayabilirsiniz.

Tedavi herpes labialis için en az 4 gün ve genital herpes için de en az 5 gün devam ettirilmelidir. Eğer iyileşme olmazsa, tedaviye 10 gün kadar devam edilebilir.

**Uygulama yolu ve metodu:**

ACYL'den az bir miktar etkilenmiş bölgeye sürün.

**Değişik yaş grupları:**

- **Çocuklarda kullanım:** Veri yoktur.
- **Yaşlılarda kullanımı:** Veri yoktur.

**Özel kullanım durumları:**

Veri yoktur.

*Eğer ACYL'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuza veya eczacınıza ile konuşun.*

**Kullanmanız gerekenden daha fazla ACYL kullandıysanız:**

Herhangi bir ters etki beklenmez. Bununla birlikte kaza ile tekrarlayan dozlarda asiklovir ağız yoluyla birkaç gün kullanıldığında gastrointestinal (bulantı ve kusma) ve nörolojik (baş ağrısı ve konfüzyon) etkiler ortaya çıkmıştır. Asiklovir hemodiyaliz (kanı temizlemek amacıyla uygulanan tedavi) ile uzaklaştırılabilir.

*ACYL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

**ACYL'i kullanmayı unutursanız**

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

**ACYL ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler**

Doktorunuza danışmadan ilacınızı kullanmayı bırakmayın.

**4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi ACYL'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

**Aşağıdakilerden biri olursa ACYL'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

Aşırı duyarlılık reaksiyonları

- Döküntü, deride kaşıntı ya da kurdeşen gibi alerjik reaksiyonlar
- Yüz, dudaklar, dil ya da vücudun diğer bölümlerinde şişlik

Aşırı duyarlılık reaksiyonları çok seyrek görülür.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın	: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın	: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan	: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek	: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok Seyrek	: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

**Yaygın olmayan yan etkiler:**

- Ciltte geçici yanma veya batma
- Deride hafif kuruma ve pullanma
- Kaşınma

**Seyrek görülen yan etkiler:**

- Kızarıklık
- Temas dermatiti (bir tür deri hastalığı)

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

**Yan etkilerin raporlanması**

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

**5. ACYL’in Saklanması**

*ACYL’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Buzdolabına koymayınız.*

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ACYL’i kullanmayınız.*

***Ruhsat sahibi:***

METİN Sağlık Ecza Deposu İlaç San.ve Tic.Ltd.Şti  
Yeşiloba Mah. 46118 Sk. No:3/B Edip Özaltın Sitesi 01100 Seyhan-Adana

***Üretici:***

Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.  
Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No:156 Sancaktepe/İST.

*Bu kullanma talimatı ..... tarihinde onaylanmıştır.*