

KULLANMA TALİMATI

ADDAMEL N IV İnfüzyon için konsantre solüsyon **Damar içine uygulanır.**

Etkin madde: Krom klorür, bakır klorür, demir klorür, manganez klorür, potasyum iyodür, sodyum florür, sodyum molibdat.2H₂O, sodyum selenit.(anhidr), çinko klorür

Yardımcı Madde(ler): Ksilitol, hidroklorik asit, enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **ADDAMEL N nedir ve ne için kullanılır?**
2. **ADDAMEL N kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **ADDAMEL N nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **ADDAMEL N'in saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. ADDAMEL N nedir ve ne için kullanılır?

- ADDAMEL N, vücut için gerekli olan eser elementleri içeren, damardan kullanılmak üzere hazırlanmış, steril çözüldür.
- ADDAMEL N; berrak hemen hemen renksiz çözelti içeren 10 ml'lik 20 adet plastik ampul içeren kutulardadır.
- ADDAMEL N yetişkinlerin damar yoluyla beslenmesinde eser element gereksinimini karşılamak üzere tamamlayıcı olarak kullanılır.

2. ADDAMEL N kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ADDAMEL N'yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- Safra yollarının tam tıkanması
- ADDAMEL N'in etkin maddelerinden ya da yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık durumları

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ADDAMEL N'nin yiyecek ve iecek ile kullanılması

ADDAMEL N'in yiyecek ve ieceklerle kullanılması bilinen bir etkisi yoktur.

Hamilelik:

Bu rnle ilgili, hamilelik sırasında klinik arařtırmalar ve hayvanlarda reme alıřmaları gerekleřtirilmemiřtir. Buna raėmen, hamile bir kadının eser elementlere olan gereksinimi, hamile olmayan kadınlarla karřılařtırıldıėında aynıdır veya hatta hafife artmıřtır. ADDAMEL N hamilelik sırasında kullanılacaėı zaman yarar/risk durumu deėerlendirildikten sonra karar verilmelidir.

İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduėunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Emzirme:

ADDAMEL N'in emzirme dneminde kullanımından nce risk/yarar iliřkisi dikkate alınmalıdır.

İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Ara ve makine kullanımı:

Herhangi bir olumsuz etkiye rastlanılmamıřtır.

Diėer ilalar ile birlikte kullanımı:

Diėer ilalarla etkileřim grlmemiřtir.

Eėer reeteli ya da reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise ltfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. ADDAMEL N nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklıėı iin talimatlar:

Doktorunuz hastalıėınıza baėlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Yetiřkinlerde kullanımı: ADDAMEL N 'nin bazal gereksinimi orta derecede artmıř hastalarda gnlk dozu 10 ml (1 ampul)'dir.

Uygulama yolu ve metodu:

Damar yoluyla verilir.

ADDAMEL N seyreltilmeden verilmemelidir.

Deėiřik yař grupları:

ocuklarda kullanımı: 15 kg ve stndeki ocuklarda tavsiye edilen doz kg bařına gnde 0,1 ml ADDAMEL N'dir.

Yařlılarda kullanımı: zel bir doz ayarlaması gerekmemektedir.

Bbrek/Karaciėer yetmezliėi: ADDAMEL N, eser elementlerin atılımının belirgin biimde azalabileceėi karaciėer ve/veya bbrek bozukluėu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. ADDAMEL N, biyokimyasal veya klinik olarak karaciėer yetmezliėi belirtisi olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

Eğer ADDAMEL N'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ADDAMEL N kullandıysanız:

ADDAMEL N'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ADDAMEL N'yi kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar için geçerli olduğu gibi ADDAMEL N'nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

ADDAMEL N içeriğinde bulunan eser elementlere ait herhangi bir yan etki bildirilmemiştir.

5. ADDAMEL N'nin saklanması

25 °C' nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

ADDAMEL N'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ADDAMEL N'yi kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Fresenius Kabi İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.
Güney Plaza Eski Büyükdere Asfaltı,
No:17/4B, Kat:2, 34398, Maslak/ İstanbul
Tel: (212) 365 56 56
Faks: (212) 365 56 99
e-posta: info.turkey@ fresenius-kabi.com

Üretici:

Fresenius Kabi Norge AS,
P.O. Box 430
1753 Halden
Norveç

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.