

## KULLANMA TALİMATI

### BROMEKSİN Şurup

**Ağızdan alınır.**

**Etkin madde:**

5 ml (1 ölçek) Bromexsin Şurup; 4 mg bromexsin hidroklorür içerir

**Yardımcı maddeler:**

Etanol % 96, Metil parahidroksi benzoat, Sitrik asit monohidrat, Ahududu aroması, Rafine şeker, Sodyum siklamat, Sodyum sakarin, Ponso 4R, Deiyonize su

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- \* *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- \* *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- \* *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- \* *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- \* *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

**Bu Kullanma Talimatında:**

1. **BROMEKSİN Şurup nedir ve ne için kullanılır?**
  2. **BROMEKSİN Şurup'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
  3. **BROMEKSİN Şurup nasıl kullanılır?**
  4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
  5. **BROMEKSİN Şurup'un saklanması**
- Başlıkları yer almaktadır.**

**1. BROMEKSİN Şurup nedir ve ne için kullanılır?**

BROMEKSİN Şurup, 100 ml ve 200 ml'lik bal renkli şişede 5 ml'lik ölçekle beraber sunulan ve her ölçekte etkin madde olarak 4 mg bromexsin hidroklorür (0.8 mg/ml) içeren bir şuruptur.

BROMEKSİN Şurup, geçmeyen öksürüklerde balgam sökmekte zorlanılıyorsa, balgam sökücü olarak kullanılır.

**2. BROMEKSİN Şurup'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

**BROMEKSİN Şurup'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Bromexsin hidroklorür veya **BROMEKSİN Şurup'un** içeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa bu ilacı kullanmayınız.

**BROMEKSİN Şurup'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

Hamileliğinizin ilk üç ayında doktorunuza danışmadan kullanmayınız. Mide ülseriniz var ise doktor tavsiyesi ile kullanılmalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

### **BROMEKSİN Şurup'un yiyecek ve içecek ile kullanılması**

Yiyecek veya içeceklerle kullanılmasında herhangi bir sorun yoktur.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

**BROMEKSİN Şurup** için, hamilelikte kullanımı ile ilgili yeterli deneyim bulunmamaktadır. Hayvan deneylerindeki tedavi dozlarında kullanıldığında fetüste herhangi bir hasar oluştuğuna dair kanıt bulunamamıştır.

Gerekli olduğu durumlarda doktorunuzun kontrolü altında kullanınız.

*Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

**BROMEKSİN Şurup** az da olsa anne sütüne geçmektedir. Doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

### **Araç ve makine kullanımı**

Çok seyrek de olsa baş dönmesine sebep olabileceğinden, araç ve makine kullanımı sırasında dikkatli olunmalıdır.

### **BROMEKSİN ŞURUP'un içeriğinde bulunan bazı maddeler hakkında önemli bilgiler**

Bromeksın Şurup, her dozda 2.9 g sukroz içerir. Bu durum, diabetes mellitus hastalarında göz önünde bulundurulmalıdır.

### **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

Antitüssif (öksürük kesici) ve ifrazatı kurutan atropin ve benzeri ilaçlarla bir arada kullanılmamalıdır.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

## **3. BROMEKSİN Şurup nasıl kullanılır?**

### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar**

BROMEKSİN Şurup balgam sökülmesine yardımcı olur ve bronşiyal salgıları artırır. Çok uzun süreli kullanımlar için uygun değildir. Tekrar kullanımlar için doktora danışılmalıdır.

Yetişkinler ve 12 yaş üzeri çocuklar:

Günde 3 kez 1 – 2 ölçek (5 – 10 ml)

### **Uygulama yolu ve metodu**

**BROMEKSİN Şurup** sadece ağızdan kullanım içindir. Ölçek kaşığı kullanılarak içilir. Çok uzun süreli kullanımlar için uygun değildir. Tedaviye başladıktan sonra 14 günde belirtilerde düzelme olmaz veya şiddetlenirse doktora danışılmalıdır.

**Değişik yaş grupları:**Çocuklarda kullanımı:

6 - 12 yaş arası çocuklarda günde 3 kez 1/2 - 1 ölçek ( 2,5 – 5 ml )

2 - 6 yaş arası çocuklarda günde 3 kez ½ ölçek ( 2,5 ml )

**Yaşlılarda kullanımı:**

Dozaj ayarlaması gerekli değildir.

**Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:**

**Böbrek/Karaciğer yetmezliği:** Böbrek yetmezliği durumlarında dikkatli olunmalıdır.

Ağır karaciğer hastalarında doktor kontrolünde alınmalıdır.

**Pediyatrik popülasyon:** **BROMEKSİN Şurup** pediyatrik hastalarda uygulama yolu ve metodu kısmında belirtildiği gibi uygulanmalıdır. İki yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

*Eğer BROMEKSİN Şurup'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

**Kullanmanız gerekenden daha fazla BROMEKSİN Şurup kullandıysanız:**

**BROMEKSİN Şurup'tan** kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

**BROMEKSİN Şurup'u kullanmayı unutursanız:**

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

**BROMEKSİN Şurup ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler**

**BROMEKSİN Şurup** tedavisi sonlandırıldığında herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmemektedir.

**4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi, **BROMEKSİN Şurup'un** içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler görülebilir.

**Aşağıdakilerden biri olursa, BROMEKSİN Şurup'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

Deri döküntüleri, yüz, dudaklar, ağız, dil ve boğazda şişme ve şişmeye bağlı yutma veya nefes alma güçlüğü.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin **BROMEKSİN Şurup'a** karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:**

Bulantı, ishal, hazımsızlık, şişkinlik, kabızlık, baş ağrısı, baş dönmesi, terleme

Bunlar **BROMEKSİN Şurup'un** hafif yan etkileridir.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

**5. BROMEKSİN Şurup'un saklanması**

**BROMEKSİN Şurup'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.**

25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki/ şişedeki son kullanma tarihinden sonra **BROMEKSİN Şurup'u** kullanmayınız.*

*Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluk fark ederseniz **BROMEKSİN Şurup'u** kullanmayınız.*

**Ruhsat Sahibi:**

ORO İlaçları Ltd. Şti.

Mimar Sinan Mahallesi.Yedpa Ticaret Merkezi. H-2 Cadde.No: 72-73

Ataşehir /İSTANBUL

Tel: 0216 661 37 38 Fax: 0216 661 37 40

E-mail:info@oroilaclari.com

**Üretici:**

Dentoral Medifarma İlaç San. Ltd.Şti.

Koşuyolu Caddesi, İbrahimağa Zaviyesi Sokak, No: 55/4

Kadıköy / İSTANBUL

***Bu kullanma talimatı 29.01.2013 tarihinde onaylanmıştır.***