

## KULLANMA TALİMATI

### BUTAMCOD FORT PLUS 22,5 mg/ 5 mL şurup

Ağız yoluyla alınır.

- **Etkin madde:** Her 5 mL şurup 22,5 mg butamirat sitrat (4,5 mg/mL) içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Sodyum sitrat dihidrat, sodyum benzoat, sorbitol %70 (non-kristalin), propilen glikol, gliserol, sukroz, masking flavour, portakal aroması, sitrik asit monohidrat, saf su.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin/çocuğunuz için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size/çocuğunuza önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **BUTAMCOD FORT PLUS nedir ve ne için kullanılır?**
2. **BUTAMCOD FORT PLUS'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **BUTAMCOD FORT PLUS nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **BUTAMCOD FORT PLUS'ın saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

#### **1. BUTAMCOD FORT PLUS nedir ve ne için kullanılır?**

- BUTAMCOD FORT PLUS etkin madde olarak butamirat sitrat içeren, şurup formunda bir ilaçtır.
- BUTAMCOD FORT PLUS, “öksürük baskılayıcı ilaçlar” olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.
- BUTAMCOD FORT PLUS, 100 mL’lik amber renkli cam şişede 5 mL’lik ölçülü kaşık ile birlikte kullanıma sunulmaktadır.
- BUTAMCOD FORT PLUS çeşitli nedenlerden kaynaklanan öksürüğün şikayetlere yönelik (sempomatik) tedavisinde kullanılır.

## **2. BUTAMCOD FORT PLUS'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

### **BUTAMCOD FORT PLUS'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eğer sizin/çocuğunuzun butamirat veya BUTAMCOD FORT PLUS'ın bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz/alerjisi varsa kullanmayınız.

Eğer çocuğunuz 3 yaşın altında ise BUTAMCOD FORT PLUS'ı kullanmayınız.

### **BUTAMCOD FORT PLUS'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

Eğer siz/çocuğunuz aynı zamanda başka balgam söktürücü ilaçlar alıyorsanız, dikkatli olmalısınız. BUTAMCOD FORT PLUS'ın bu tür ilaçlarla aynı anda kullanılmaması önerilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin/çocuğunuz için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Öksürük 7 günden daha uzun süre devam ederse doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

### **Hamilelik**

- *İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- Hamile iseniz, ilk üç ay BUTAMCOD FORT PLUS kullanmamanız önerilmektedir. Daha sonraki dönemde, ancak doktorunuz kesin gereklilik olduğuna karar verirse BUTAMCOD FORT PLUS kullanabilirsiniz.
- *Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

### **Emzirme**

- *İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- Bebeğinizi emziriyorsanız, BUTAMCOD FORT PLUS almadan önce doktorunuza danışınız.

### **Araç ve makine kullanımı**

- BUTAMCOD FORT PLUS uykulu hissetmenize neden olabilir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken veya dikkat gerektiren işleri yaparken dikkatli olunuz.

### **BUTAMCOD FORT PLUS'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

BUTAMCOD FORT PLUS sorbitol içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani aslında "sodyum içermez".

BUTAMCOD FORT PLUS sukroz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

### **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

Eğer balgam söktürücü özelliği olan başka ilaçlar kullanıyorsanız doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. BUTAMCOD FORT PLUS nasıl kullanılır?**

#### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde kendiniz/çocuğunuz için belirtilen dozlarda kullanınız:

6 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmez.

6-12 yaşındaki çocuklarda: Günde 2 defa 1 ölçülü kaşık (5 ml)

12 yaş üzeri ergenlerde (adolesanlarda): Günde 3 defa 1 ölçülü kaşık (5 ml)

Yetişkinlerde: Günde 4 defa 1 ölçülü kaşık (5 ml)

Doktorunuz farklı bir tavsiyede bulunmadıkça, BUTAMCOD FORT PLUS'ı 1 haftadan daha uzun süre kullanmayınız.

#### **Uygulama yolu ve metodu:**

BUTAMCOD FORT PLUS ağız yoluyla kullanılır.

İlacınızın dozunu ayarlamak için ölçülü kaşığı kullanınız. Ölçülü kaşığı her kullanımda yıkayıp kurulaştırınız.

#### **Değişik yaş grupları:**

##### **Çocuklarda kullanımı:**

BUTAMCOD FORT PLUS'ın 6 yaş altındaki çocuklarda kullanımı önerilmez.

##### **Yaşlılarda kullanımı:**

BUTAMCOD FORT PLUS'ın yaşlılarda kullanımı araştırılmamıştır.

##### **Özel kullanım durumları:**

BUTAMCOD FORT PLUS böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda araştırılmamıştır.

*Eğer BUTAMCOD FORT PLUS'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

#### **Kullanmanız gerekenden daha fazla BUTAMCOD FORT PLUS kullandıysanız:**

*BUTAMCOD FORT PLUS'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

#### **BUTAMCOD FORT PLUS'ı kullanmayı unutursanız:**

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

Aşırı dozda BUTAMCOD FORT PLUS alınması halinde şu belirtiler görülebilir: Uyku hali, bulantı, kusma, ishal, sersemlik ve tansiyon düşmesi. Bu etkiler doz azaltılınca veya tedavi

kesilince ortadan kalkabilir. Eđer ila kesildiđinde bu etkiler devam ediyorsa doktorunuz veya eczacınıza danıřınız.

**BUTAMCOD FORT PLUS ile tedavi sonlandırıldıđındaki oluřabilecek etkiler**  
Bulunmamaktadır.

#### **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilalar gibi, BUTAMCOD FORT PLUS'un ieriđinde bulunan maddelere duyarlı olan kiřilerde yan etkiler olabilir.

**Ařađıdakilerden biri olursa BUTAMCOD FORT PLUS'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil blmne bařvurunuz:**

- Ciltte dknt

Bu ok ciddi bir yan etkidir. Eđer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin BUTAMCOD FORT PLUS'a karřı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi mdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu ok ciddi yan etki olduka seyrek grlr.

**Ařađıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza syleyiniz:**

- Uyku hali
- Bulantı
- İřhal

Bunlar BUTAMCOD FORT PLUS'ın hafif yan etkileridir.

#### **Yan etkilerin raporlanması**

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemřireniz ile konuřunuz. Ayrıca karřılařtıđınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan "İla Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak dođrudan ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Trkiye Farmakovijilans Merkezi (TFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduđunuz ilacın gvenliliđi hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sađlamıř olacaksınız.

*Eđer bu kullanma talimatında bahsi gemeyen herhangi bir yan etki ile karřılařırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

#### **5. BUTAMCOD FORT PLUS'ın saklanması**

*BUTAMCOD FORT PLUS'ı ocukların gremeyeceđi, eriřemeyeceđi yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

25°C altındaki oda sıcaklıđında saklayınız.

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BUTAMCOD FORT PLUS'ı kullanmayınız.*

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluk fark ederseniz BUTAMCOD FORT PLUS'ı kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

**Ruhsat sahibi:** KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.  
Mahmutbey Mah. 2477. Sok. No:23  
Bağcılar / İstanbul  
Telefon: 0212 410 39 50  
Faks: 0212 447 61 65

**Üretim yeri:** KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.  
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi  
Karaağaç Mah. 11. Sok. No: 5  
Kapaklı/ Tekirdağ

*Bu kullanma talimatı ... /... /... tarihinde onaylanmıştır.*