

KULLANMA TALİMATI

CAPCIDERM %0.075 krem

Haricen kullanılır.

Etkin madde: Her 1 gram krem; 0.75 mg kapsaisin içerir.

Yardımcı maddeler: Benzil alkol, setil alkol, sorbitol (%70) çözeltisi, beyaz parafin, isopropil miristat, gliseril stearat, PEG 100 stearat ve deiyonize su içermektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz. Çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

- 1- **CAPCIDERM nedir ve ne için kullanılır?**
- 2- **CAPCIDERM'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
- 3- **CAPCIDERM nasıl kullanılır?**
- 4- **Olası yan etkiler nelerdir?**
- 5- **CAPCIDERM'in saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1 – CAPCIDERM nedir ve ne için kullanılır?

CAPCIDERM; 45 g'lık alüminyum tüplerde pazarlanan, kapsaisin içeren ve haricen kullanılan bir kremdir.

CAPCIDERM,

- Zona (*Herpes zoster*) olduktan sonra deri yüzeyine yakın sinirlerden kaynaklanan ağrının giderilmesinde,
- Şeker hastalığı nedeniyle ellerine veya ayaklarına giden sinirlerde hasar olan hastalarda ağrının giderilmesinde,
- Eklem iltihabı, eklem kireçlenmesi, kas ve eklem ağrılarının giderilmesinde kullanılır.

2 – CAPCIDERM'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CAPCIDERM'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

- Kapsaisine ve CAPCIDERM'in bileşiminde yer alan maddelere karşı alerjiniz varsa,
- Çatlamış veya tahriş olmuş deri üzerinde,

- 12 yaşın altındaki çocuklarda.

CAPCIDERM'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- Gözlere temas ettirmeyiniz. Yanlışlıkla gözünüze kaçarsa veya çatlamış ya da tahriş olmuş deri üzerine bulaşırsa, bol miktarda suyla yıkayınız.
- Kremi uyguladıktan hemen sonra ellerinizi yıkayınız ancak uygulama yaptığınız bölge ellerinizse, bu durumda ellerinizi uygulamadan 30 dakika sonra yıkayınız.
- CAPCIDERM kremi uygulamadan hemen önce veya uyguladıktan hemen sonra sıcak banyo veya duş yapmaktan kaçınınız.
- CAPCIDERM krem üzerine sıkı bandaj uygulamayınız.
- Kremin buğusunu solumaktan kaçınınız çünkü gözlerde tahrişe ve solunum güçlüklerine (astımın kötüleşmesi dahil) neden olabilir.
- Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

CAPCIDERM'in yiyecek ve içecek ile kullanılması:

Yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik:

- *İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- Hamilelik döneminde gerekli olduğu durumlarda doktorunuzun kontrolü altında kullanınız.
- *Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.*

Emzirme:

- *İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- CAPCIDERM'i emzirme döneminde doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı:

Araç ve makine kullanımına bilinen olumsuz bir etkisi yoktur.

CAPCIDERM'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Setil alkol içermesi nedeniyle CAPCIDERM lokal deri reaksiyonlarına (örn. temas dermatiti) yol açabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

CAPCIDERM'in diğer tıbbi ürünlerle topikal uygulama aracılığıyla bilinen ya da beklenen bir etkileşimi yoktur.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3 – CAPCIDERM nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği durumlarda CAPCIDERM'i günde 3 - 4 kez uygulayınız. Her uygulama arası en az 4 saat olmalıdır. Diyabete bağlı sinir hasarından kaynaklanan ağrıyı gidermek için CAPCIDERM kullanıldığında, tedavi normalde 8 hafta sürmektedir.

Uygulama yolu ve metodu:

CAPCIDERM sadece haricen kullanım içindir.

- Az miktarda kremi (bezelye büyüklüğünde), uygulama yapılacak bölge üzerine parmaklarınızla ovarak yayınız. Krem görünmez hale gelene kadar ovmayı sürdürünüz.
- CAPCIDERM uygulamasından sonra **derhal ellerinizi yıkayınız**, ancak ellerinizdeki sinir hasarını tedavi ediyorsanız, bu durumda ellerinizi yıkamadan 30 dakika bekleyiniz.

Değişik yaş grupları:**Çocuklarda Kullanım:**

12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda Kullanım:

CAPCIDERM'in yaşlı hastalardaki kullanımını yetişkinlerdeki gibidir.

Özel kullanım durumları:**Böbrek/Karaciğer yetmezliği:**

Ağır böbrek ve karaciğer yetmezliği durumunda özel bir kullanım yoktur.

Eğer CAPCIDERM'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden fazla CAPCIDERM kullandıysanız:

CAPCIDERM'i kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

CAPCIDERM, sınırlı ve yüzeysel bir bölgede kullanıldığından aşırı dozda kullanılmasının bir yan etkisi yoktur.

CAPCIDERM'i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

CAPCIDERM ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Bulunmamaktadır. Tedavi döneminden sonra bir iyileşme görülmezse tanı ve tedavi gözden geçirilmelidir.

4 - Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, CAPCIDERM'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, CAPCIDERM'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

- Yüz, dil, boğazda şişme
- Nefes darlığı, hırıltılı soluma

Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bu yan etkiler sizde mevcut ise sizin CAPCIDERM'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

- Burun akıntısı
- Öksürme
- Hapşırma
- Nefes darlığı veya astımın kötüleşmesi şeklinde gözlerde, burunda ve boğazda kısa süreli tahriş

CAPCIDERM krem, uygulandığında kısa süreli yanma hissine yol açabilir. Bu yanma özellikle aşağıdaki durumlarda görülür:

- Krem, günde 3 veya 4 kereden az kullanıldığında
- Çok fazla krem uygulandığında
- Krem, sıcak banyo veya duştan hemen önce veya sonra uygulandığında

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5 – CAPCIDERM’in saklanması

CAPCIDERM’i çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Tüpün veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden önce CAPCIDERM’i kullanınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CAPCIDERM’i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: Berko İlaç ve Kimya San.A.Ş.

Adres : Yenişehir Mah. Özgür Sok. No: 16 Ataşehir/İstanbul

Telefon : 0216 456 65 70 Pbx

Faks : 0216 456 65 79

e-mail : info@berko.com.tr

Üretici : Münir Şahin İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Adres : Yunus Mahallesi, Sanayi Caddesi No:22 Kartal/İstanbul

Telefon : 0216 306 62 60 (5 Hat)

Faks : 0216 353 94 26

Bu kullanma talimatı [22/11/2012](#) tarihinde onaylanmıştır.