

KULLANMA TALİMATI

DENTİNOX diş jeli **Diş ve dişetlerine uygulanır.**

Etkin madde: Beher gram jel etkin madde olarak; 3.4 mg Lidokain hidroklorür (1H₂O), 3.2 mg Hidroksipolietoksidodekan ve 150.0 mg Kamomil tentürü içerir.

Yardımcı madde: Ksilitol, % 70'lik sorbitol solüsyonu, propilen glikol, karbomer 934 P, % 10'luk sodyum hidroksit solüsyonu, polisorbata 20, sodyum sakkarin, mentol, distile su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında :

1. ***DENTİNOX nedir ve ne için kullanılır?***
2. ***DENTİNOX'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler***
3. ***DENTİNOX nasıl kullanılır?***
4. ***Olası yan etkiler nelerdir?***
5. ***DENTİNOX'un saklanması***

Başlıkları yer almaktadır.

1. DENTİNOX nedir ve ne için kullanılır ?

DENTİNOX, 10 g ve 20 g'lık alüminyum tüplerde sunulan bir ilaçtır.

DENTİNOX, etkin madde olarak lidokain hidroklorür, hidroksipolietoksidodekan ve kamomil tentürü içerir.

DENTİNOX, ağrı kesici ve iltihap giderici etkileri sayesinde, çocuklarda diş çıkarma sırasında görülen veya dişeti iltihabı sırasında görülen ağrılı ve iltihaplı durumların giderilmesinde kullanılır.

2. DENTİNOX'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DENTİNOX'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Etkin madde veya formüldeki yardımcı maddelerden herhangi birine alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise bu ilacı kullanmayınız.

DENTİNOX'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Diş etinde ciddi kızarıklık ve şişme olması durumunda doktorunuza bildiriniz.

Göze temas ettirilmemelidir.

“Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

DENTİNOX'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

DENTİNOX'un yiyecek ve içecekler ile etkileşmesi beklenmemektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

İlacın hamilelik boyunca kullanılıp kullanılmayacağına bir hekim karar vermelidir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme dönemi boyunca ilacın kullanılıp kullanılmayacağına bir hekim karar vermelidir.

Araç ve makine kullanımı

Araç ya da makine kullanımı üzerine herhangi bir etki bildirilmemiştir.

DENTİNOX'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

DENTİNOX sorbitol içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

DENTİNOX propilen glikol içerdiğinden iritasyona neden olabilir.

İçeriğinde bulunan diğer yardımcı maddeler için kullanım yolu veya dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

DENTİNOX'un diğer ilaçlar ile birlikte kullanımında herhangi bir geçimsizlik bildirilmemiştir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. DENTİNOX nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar :

Doktorunuz başka bir tavsiyede bulunmadıkça; günde 2-3 kez DENTİNOX uygulaması yeterlidir.

Uygulama yolu ve metodu:

Doktorunuz başka bir tavsiyede bulunmadıkça; diş etinin etkilenmiş bölgesine temiz bir parmak ya da pamuk yardımı ile uygulanıp hafifçe masaj yapılır. Özellikle yemeklerden sonra ve uykudan önce uygulanmalıdır.

Değişik yaş grupları :

Çocuklarda kullanımı : Yaş sınırı bulunmamaktadır.

Yaşlılarda kullanımı : Doz ayarlaması gerekli değildir.

Özel kullanım durumları :

Böbrek/Karaciğer yetmezliği : Doz ayarlaması gerekli değildir.

Eğer DENTİNOX'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DENTİNOX kullandıysanız

DENTİNOX'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

DENTİNOX'u kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

DENTİNOX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

DENTİNOX tedavisi sonlandırıldığında, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

4. Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi DENTİNOX'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, DENTİNOX'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Yüz, dudaklar, dil ve/veya boğazda şişmeye neden olan, yutma veya nefes alma zorluklarına veya ciltte şiddetli kaşıntıya yol açabilen ciddi alerjik reaksiyon.

'Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DENTİNOX'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.'

'Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.'

DENTİNOX ile ilgili olarak başka bir yan etki bildirilmemiştir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza bilgilendiriniz.

5. DENTİNOX'un saklanması

DENTİNOX'u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DENTİNOX'u kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz *DENTİNOX'u kullanmayınız.*

Ruhsat sahibi:

DENTİNOX GESELLSCHAFT (Almanya) lisansı ile
Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 4 34467
Maslak / Sarıyer / İstanbul

Üretim yeri:

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Sanayi Mah. Tunç Cad. No : 3
Esenyurt / İstanbul

Bu kullanma talimatı (gün/ay/yıl) tarihinde onaylanmıştır.