

## KULLANMA TALİMATI

**DERMİTON %10 losyon, 100 ml**

**Haricen kullanılır.**

**Etkin madde:** Her 1 ml losyon 100 mg krotamiton içerir.

**Yardımcı maddeler:** İsopropil miristat, setil alkol, stearik asit, gliseril monostearat-PEG 100 stearat, propilen glikol, sorbik asit, setostearil alkol, feniletıl alkol, esans Drom no:468411 ve deiyonize su.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz. Çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

- 1- **DERMİTON nedir ve ne için kullanılır?**
- 2- **DERMİTON'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
- 3- **DERMİTON nasıl kullanılır?**
- 4- **Olası yan etkiler nelerdir?**
- 5- **DERMİTON'un saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

### **1 - DERMİTON nedir ve ne için kullanılır?**

DERMİTON; 100 ml'lik sprey başlıklı cam şişelerde pazarlanan, krotamiton içeren ve haricen kullanılan bir losyondur.

DERMİTON; güneş yanığı, kuru egzema, kaşıntılı deri iltihabı (dermatit), alerjik döküntüler, ciltte çeşitli nedenlerle oluşan kaşıntılı döküntüler (ürtiker), su çiçeği, böcek ısırıkları ve sokmaları, pişik ve kaşıntı nedeni ile oluşan cilt hassasiyetlerinin ve kaşıntısının giderilmesinde ve uyuz tedavisinde kullanılır.

### **2 – DERMİTON'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

**DERMİTON'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eğer,

- krotamiton, ya da DERMİTON'un içindeki diğer maddelerden herhangi birine alerjiniz varsa,
- iltihap sızıntısı olan cilt hastalığınız (akut eksüdatif dermatoz) varsa kullanmayınız.

## **DERMİTON'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

Eğer,

- hamile iseniz, emziriyorsanız veya genital bölgenizde kaşıntı varsa
- 3 yaşın altındaki çocuklar için kullanılacaksa.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

### **DERMİTON'un yiyecek ve içecek ile kullanılması:**

Dermiton'un yiyecek ve içecekler ile kullanımı hakkında veri bulunmamaktadır.

### **Hamilelik:**

- *İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- Eğer hamile iseniz DERMİTON losyon kullanımı önerilmez.
- *Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.*

### **Emzirme:**

- *İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- Emzirme döneminde DERMİTON losyon kullanımı önerilmez.

### **Araç ve makine kullanımı**

Araç ve makine kullanımı becerisi üzerine etkileri hakkında hiçbir çalışma yapılmamıştır.

### **DERMİTON'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler.**

DERMİTON, bölgesel deri tepkimelerine (örneğin temasla ortaya çıkan deri hastalığı (kontakt dermatite)) neden olabilecek olan stearyl alkol ve setostearil alkol içermektedir.

DERMİTON, içeriğinde bulunan propilen glikol sebebiyle ciltte irritasyona neden olabilir.

Eğer daha önce doktorunuz tarafından DERMİTON'un içeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

### **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

DERMİTON'un diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı hakkında veri bulunmamaktadır.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3 - DERMİTON nasıl kullanılır?**

#### **Uygun kullanım ve dozu / uygulama sıklığı için talimatlar:**

##### *Kaşıntı:*

Etkilenen bölgeye günde 2-3 kez tatbik edilir. DERMİTON, her uygulama sonrası 6 – 10 saatlik bir rahatlama sağlayacaktır.

##### *Uyuz:*

Ilık bir banyo yaptıktan sonra cildinizi iyice kurulayınız ve DERMİTON'u yüzeyde görünür losyon kalıntıları kalmayacak şekilde tüm vücudunuza (yüz ve baş bölgeleri dışında) uygulayınız. Bu uygulama 3 – 5 gün süre ile günde bir kez, tercihen akşamüzeri tekrarlanmalıdır.

Özellikle ev tozu akarlarının çoğalmasına (mite infestasyona) açık bölgeler (örneğin kıvrım bölgeleri, bilekler, koltuk altı ve genital bölgeler) tedaviye alınan cevap açısından dikkatle incelenmelidir. İltihap oluşumu olan bölgeleri DERMİTON uygulanmış bezle kapatınız. Tedavi devam ederken bir sonraki uygulamadan kısa süre önce banyo yapabilirsiniz. Tedavinin tamamlanmasını takiben, temizlenme için banyo yapılmalı, yatak takımları ve iç çamaşırlar değiştirilmelidir.

**Uygulama yolu ve metodu:**

DERMİTON sadece haricen kullanım içindir. Kullanmadan önce çalkalayınız.

Göze ve göz çevresine uygulanmamalıdır. Çünkü göz kapakları ile teması durumunda konjunktival enflamasyona yol açabilir.

**Değişik yaş grupları:**

**Çocuklarda kullanım:**

DERMİTON çocuklarda kullanılabilir, özel bir doz ayarlamasına gerek bulunmamaktadır.

*Uyuz:*

3 yaşın altındaki çocuklarda DERMİTON günde bir kezden fazla kullanılmamalıdır.

**Yaşlılarda Kullanım:**

DERMİTON'un yaşlı hastalardaki kullanımında bir özellik yoktur.

**Özel kullanım durumları Böbrek/Karaciğer yetmezliği:**

DERMİTON'un böbrek/karaciğer yetmezliği olanlarda kullanımında bir özellik yoktur.

*Eğer DERMİTON'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

**Kullanmanız gerekenden fazla DERMİTON kullandıysanız:**

*DERMİTON'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

**DERMİTON'u kullanmayı unutursanız:**

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.*

Daha sonraki normal kullanım saatine göre önerilen dozu kullanmaya devam ediniz.

**DERMİTON ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:**

Bulunmamaktadır.

**4 - Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi, DERMİTON'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Olası yan etkiler aşağıdaki sıklık derecesine göre listelenmiştir:

Yan etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1 inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.  
Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.  
Bilinmiyor: Eldeki veriler ile tahmin edilemiyor.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:**

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir):

- Kaşıntı

Seyrek (1.000 hastanın birinden az görülebilir):

- Kontakt dermatit, aşırı duyarlılık durumları (döküntü, egzama, cilt kızarıklıkları (eritem), cilt tahrişleri (deri iritasyonu), el ve ayaklarda, dudaklarda, genital organlarda ve gözkapaklarındaki yumuşak dokuda daha derin ve geniş ödemin bulunduğu cilt reaksiyonu (anjioödem) gibi).

Bunlar DERMİTON'un hafif yan etkileridir.

Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

**5 – DERMİTON'un Saklanması**

*DERMİTON'u çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.*

**Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.**

*Tüpün veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden önce DERMİTON'u kullanınız.*

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz DERMİTON'u kullanmayınız.

**Ruhsat Sahibi:**

Berko İlaç ve Kimya San.A.Ş.  
Yenişehir Mah. Özgür Sok. No: 16 Ataşehir/İstanbul  
0216 456 65 70 (Pbx)  
0216 456 65 79 (Faks)  
[info@berko.com.tr](mailto:info@berko.com.tr)

**Üretim Yeri:**

Berko İlaç ve Kimya San.A.Ş.  
Adil Mah. Beykoz Cad. Tamıdık Sok. No: 1 Sultanbeyli/ İstanbul  
+90 216 592 33 00  
+90 216 592 00 62 (Faks)

Bu kullanma talimatı 02/12/2013 tarihinde onaylanmıştır.