

ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Katran renkli dışkı yada dışkıda açık renkli kan olması
- Şiddetli mide ağrısı ile beraber kusma olması

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Bu ciddi yan etkiler oldukça seyrek görülür.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:**

- İshal
- Bulantı
- Karında mide bölgesinde ağrı
- Mide yanması
- Midede şişkinlik
- Kabızlık
- Kusma
- Dışkı renginin koyulaşması
- Dişlerin koyu renk boyanması

Bunlar FERROZİNC-G'nin hafif yan etkileridir. Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

#### 5- FERROZİNC-G'nin Saklanması

FERROZİNC-G'yi *çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.* 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

#### Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

*Etiketin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden önce FERROZİNC-G'yi kullanınız.*

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz FERROZİNC-G'yi kullanmayınız.

#### Ruhsat Sahibi: Berko İlaç ve Kimya San.A.Ş.

Adres : Yenişehir Mah. Özgür Sok. No: 16 Ataşehir/İstanbul  
Telefon : 0216 456 65 70 Pbx  
Faks : 0216 456 65 79  
e-mail : info@berko.com.tr

#### Üretici: Berko İlaç ve Kimya San.A.Ş.

Adres : Adil Mah. Beykoz Cad. Tanıdık Sok. No: 1 Sultanbeyli/ İstanbul  
Telefon : 0 216 592 33 00  
Faks : 0 216 592 00 62

Bu kullanma talimatı 26/08/2011 tarihinde onaylanmıştır.

PR-0655-01

## KULLANMA TALİMATI

# FerroZinc-G® şurup, 100 mL

Ağızdan alınır.

**Etkin madde:** Her 5 mL (1 ölçek) şurup 40 mg demir (demir glukonat halinde), 15 mg çinko (çinko glukonat halinde) içerir.

**Yardımcı maddeler:** Sitrik asit, sorbitol, sodyum sakarin, gliserin, sodyum benzoat, ahududu esansı ve deiyonize su

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz. Çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük doz kullanmayınız.***

#### Bu Kullanma Talimatında:

##### 1- FERROZİNC-G nedir ve ne için kullanılır?

##### 2- FERROZİNC-G'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

##### 3- FERROZİNC-G nasıl kullanılır?

##### 4- Olası yan etkiler nelerdir?

##### 5- FERROZİNC-G 'nin saklanması

**Başlıkları yer almaktadır.**

#### 1- FERROZİNC-G nedir ve ne için kullanılır?

FERROZİNC-G, 100 mL'lik amber renkli cam şişede, 5 mL'sinde 40 mg demir (demir glukonat halinde) 15 mg çinko (çinko glukonat halinde) içeren şuruptur.

FERROZİNC-G, değişik kökenli tüm demir eksikliği ile demir eksikliğine bağlı kansızlık (anemi) tedavisinde ve demir eksikliğine bağlı kansızlıkta görülen çinko eksikliğinde kullanılır.

#### 2- FERROZİNC-G'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

##### FERROZİNC-G'yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

- Demir emilimi (hemokromatoz) veya demir depolanması (hemosideroz) bozukluğu hastalığımız varsa;
- Kurşun anemisi veya akdeniz anemisi hastalığınız varsa;
- Demir eksikliğinin neden olmadığı aneminiz (B12 vitamini eksikliğine bağlı megaloblastik anemi, hemolitik anemi) varsa;
- Düzenli olarak devamlı kan nakli yapılıyorsa;
- HIV enfeksiyonunuz varsa;
- Demir eksikliğiniz klinik olarak kesinleştirilmemişse;

#### FERROZİNC-G'yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

Çocuğunuzda demir eksikliğine bağlı olmayan kansızlık varsa doktora danışmadan kullanmayınız. Mide ülseriniz varsa doktor kontrolünde kullanınız.

Hamilelik durumunda doktora danışmadan kullanmayınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

#### FERROZİNC-G'nin yiyecek ve içecek ile kullanılması:

Çay, kahve, süt, peynir, yumurta demir ve çinko emilimini azaltacağından birlikte kullanmayınız. FERROZİNC-G'yi yukarıdaki besinlerden en az bir saat önce yada iki saat sonra alınız.

#### Hamilelik:

- İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- Hamilelik döneminde gerekli olduğu durumlarda doktorunuzun kontrolü altında kullanınız.
- Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.*

#### Emzirme:

- İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- FERROZİNC-G süte geçebileceği için emzirme döneminde gerekli olduğu durumlarda doktorunuzun kontrolü altında kullanınız.

#### Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımına olumsuz bir etkisi yoktur

#### FERROZİNC-G'nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İçeriğinde bulunan sorbitol nedeniyle, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığımız olduğu söylenmişse FERROZİNC-G'yi almadan önce doktorunuza danışınız.

Bu tıbbi ürün her 5 mL' lik dozunda 1 mmol (23 mg)' dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

#### Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

FERROZİNC-G aşağıdaki ilaçlar ile birlikte dikkatli kullanılmalıdır;

- Mide asidini azaltan antiasit ilaçlar (magnezyum trisilikat ve karbonat)
- Bazı ağrı kesici ilaçlar (salisilatlar, fenilbutazon ve oksifenbutazon)
- Bazı iltihap önleyici ilaçlar (tetrasiklin)
- Bazı romatizmal hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar (ağızdan alınan oral altın bileşikleri)

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

#### 3- FERROZİNC-G nasıl kullanılır?

##### Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği durumlarda FERROZİNC-G' yi çocuklarda 2-3 doza bölerek aşağıdaki gibi kullanınız.

Hastanın yaşı	Verilecek miktar
6 - 12 ay	1 - 1,5 mL
1 - 3 yaş	1,5 - 2,5 mL
4 - 8 yaş	3 - 5 mL
9 - 12 yaş	5 - 7,5 mL
13 - 18 yaş	5 - 10 mL

- Ciddi demir yetersizliğine bağlı kansızlıklarda: günde 4 kez 5 mL kullanınız.
- Yapılan kan tahlilinde, doktorunuz kan değerlerinizin normale döndüğünü söyleyinceye kadar aynı dozda kullanmaya devam ediniz. Daha sonra 2 ay süreyle günde 2 kez 5 mL kullanınız.
- Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız.

#### Uygulama yolu ve metodu:

FERROZİNC-G sadece ağızdan kullanım içindir.

- Yemeklerden en az 1 saat önce veya 2 saat sonra ölçek kaşığı veya pipet kullanılabilir.

#### Değişik yaş grupları:

##### Yaşlılarda Kullanım:

FERROZİNC-G'nin yaşlı hastalardaki kullanımında bir özellik yoktur.

#### Özel kullanım durumları:

##### Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

FERROZİNC-G'yi böbrek ve karaciğer yetmezliği durumunda kullanmayınız.

*Eğer FERROZİNC-G'nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

#### Kullanmanız gerekenden fazla FERROZİNC-G kullandıysanız:

*FERROZİNC-G'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

Şurubun aşırı dozda alınması halinde şu belirtiler görülebilir: uyuklama, bulantı, kusma, ishal, baş dönmesi ve kan basıncında düşme (hipotansiyon).

6 yaş altı çocuklarda demir içeren ürünlerin yanlışlıkla 60 mg/kg dozunda (1.5 kaşık/kg veya pipetle 7.5 ml/kg) alınması/yutulması fatal (ölümcül) zehirlenmelere yol açar. Bu nedenle FERROZİNC-G şurubu, çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız. Aşırı dozda alınması durumunda derhal doktorunuza ya da Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)'ni arayınız.

#### FERROZİNC-G 'yi kullanmayı unutursanız:

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

Daha sonraki normal alım saatine göre önerilen doza yeniden almaya devam ediniz.

#### FERROZİNC-G ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Bulunmamaktadır.

#### 4- Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, FERROZİNC-G'nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

**Aşağıdakilerden biri olursa, FERROZİNC-G'yi kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.**

- Yüz, dil, boğazda şişme
- Nefes darlığı, hırıltılı solunum
- Kan basıncında aşırı düşme, baş dönmesi, denge kaybı
- Kurdeşen (ürtiker) ve kaşıntı, deri döküntüleri

Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bu yan etkiler sizde mevcut ise sizin FERROZİNC-G'ye karşı