

KULLANMA TALİMATI

FRENAG %1 Jel Cilt üzerine uygulanır

- **Etkin madde:** Her bir tüpte (30 g), 300 mg nimesulid.
- **Yardımcı maddeler:** Makrogol 400, propilen glikol, Karbomer 940, Alkol (%96), Saf su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük doz kullanmayınız.***

Bu Kullanma Talimatında:

1. **FRENAG nedir ve ne için kullanılır?**
2. **FRENAG' ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **FRENAG nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **FRENAG'ın saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. FRENAG nedir ve ne için kullanılır?

- FRENAG etkin madde olarak iltihap önleyici, ağrı kesici ve ateş düşürücü etkiye sahip, güçlü bir non-steroidal antiinflamatuar olan nimesulid içeren bir ilaçtır.
- FRENAG şeffaf ve sarı renkli 30 g jel içeren, ağzı plastik kapakla kapatılmış, lamine tüplerde ve karton kutu içerisinde kullanıma sunulmaktadır.
- FRENAG aşağıdaki hastalıkların bölgesel tedavisinde ağrı kesici ve iltihap giderici olarak etkilidir;

- Yumuşak doku romatizmal hastalıkları
- Ezilme ve burkulma yumuşak doku rahatsızlıkları
- Ağrı, iltihap ve kas gerginliği ile kendini gösteren kas ve iskelet sistemi hastalıkları

2. FRENAG'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FRENAG'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

- FRENAG'ın içeriğindeki maddelerden herhangi birine veya nimesulide karşı alerjiniz var ise;
- Asetilsalisilik asit içeren (aspirin vb.) veya diğer NSAİ ilaçlara karşı aşırı duyarlılığınız, alerjiniz var ise;
- İlk uygulama sırasında ya da sonrasında ciltte alerjik reaksiyonlar oluşursa (kaşınma, yanma ve kızarıklık gibi)
- FRENAG'ı uygulayacağınız cilt bölgesinde açık bir yaranız veya enfeksiyon var ise;
- Çocuklardaki hastalıklar için kullanıyorsanız

FRENAG'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer

- FRENAG'ı geniş vücut alanlarında, yüzde veya göze yakın yerlerde kullanacaksınız

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız.

FRENAG'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

FRENAG'ın yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

- *İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- FRENAG gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.
- *Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya*

eczacınıza danışınız.

Emzirme

- *İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- FRENAG'ın emzirme döneminde kullanılması tavsiye edilmez.
- FRENAG'ı emzirmeden önce göğüs üzerine uygulamayınız.

Araç ve makine kullanımı

FRENAG uygulaması ile ilgili araç veya makine kullanımı üzerine herhangi bir etki oluşturmaz.

FRENAG'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

FRENAG'ın içeriğinde bulunan propilen glikol, ciltte iritasyona neden olabilir.

FRENAG'ın içeriğinde bulunan %5 oranındaki etanol hiçbir olumsuz etki oluşturmaz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

FRENAG'ın herhangi bir ilaç veya madde ile bilinen bir geçimsizliği yoktur.

Diğer topikal kremlerle birlikte uygulanmamalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza ve eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. FRENAG nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği sürece aşağıdaki dozlarda kullanınız.

Az miktarda FRENAG'ı günde 3 veya 4 defa etkilenen bölgeye uygulayınız.

Uygulama yolu ve metodu:

FRENAG'ı etkilenen bölgeye nazikçe uygulayınız.

Tedavi sırasında bandajlama veya kapalı pansuman (oklüzyon) uygulamayınız.

Etkilenen bölgeye FRENAG'ı kuvvetli bir şekilde oarak sürmeyiniz.

Değişik Yaş Grupları

Çocuklarda Kullanımı:

FRENAG 12 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılar "Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar" bölümünde belirtildiği şekilde kullanılabilirler.

Özel kullanım durumları:

Böbrek / karaciğer yetmezliği:

Doz ayarlamasına gerek yoktur.

Eğer FRENAG'ın, etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla FRENAG kullandıysanız:

FRENAG'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

FRENAG'ı kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

FRENAG ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

Bulunmamaktadır.

4. Olası Yan Etkiler Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, FRENAG'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler ortaya çıkabilir.

Yaygın

- Uygulama bölgesinde tahriş
- Kızarıklık
- Deri döküntüleri
- Pullanma

- Kaşıntı

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. FRENAG'ın Saklanması

FRENAG'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FRENAG'ı kullanmayınız / son kullanma tarihinden önce kullanınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz FRENAG'ı kullanmayınız.

Ruhsat sahibi: HELBA İlaç ve Dış San. Tic. Ltd. Şti.,

ÖVEÇLER 68.Sok. No: 5/2 ÇANKAYA / ANKARA

Üretim yeri: Merkez Laboratuvarı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Çamlık mahallesi Sırrı Çelik Bulvarı Ayça Sokak No:4 34788 Taşdelen-İSTANBUL

*Bu kullanma talimatı **04.02.2011** tarihinde onaylanmıştır.*